

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของการพยาบาลที่สนับสนุนระดับประคองในระยะคลอด ตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้คลอด ในโรงพยาบาลราชวิถี ประชากรกลุ่มพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในห้องคลอด จำนวนทั้งสิ้น 55 คน และผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับบริการการคลอด และพักฟื้นภายหลังคลอดที่ตึกสามัญสูติกรรมในโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมของการพยาบาลที่สนับสนุนระดับประคองการรับรู้ของพยาบาลและผู้คลอด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประยุกต์มาจากแบบสอบถามของบังอร ศิริบุรณะภานนท์ โดยใช้แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม แนวคิดของคอลลิสเตอร์และการพยาบาลในระยะคลอด วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที่ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ของพยาบาลในการให้การพยาบาลที่สนับสนุนระดับประคอง อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.94, S.D. = 0.38$) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การให้การพยาบาลด้านจิตใจ อารมณ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้านความสุขสบายและความปลอดภัยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนการรับรู้ของผู้คลอดในการได้รับการพยาบาลที่สนับสนุนระดับประคองอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.62, S.D. = 0.24$) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านจิตใจ อารมณ์ และด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก แต่ด้านความสุขสบายและความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของการพยาบาลที่สนับสนุนระดับประคองตามการรับรู้ของพยาบาล และผู้คลอดที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $P < .001$

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ พยาบาลควรตระหนักถึงความสำคัญของการให้การพยาบาลที่สนับสนุนระดับประคอง โดยที่พยาบาลต้องมีการประเมินการรับรู้ความต้องการของผู้คลอดก่อนที่จะให้การพยาบาล รวมทั้งควรจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ของพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาประยุกต์ใช้กับผู้คลอดได้เหมาะสมถูกต้อง และส่งเสริมการจัดรูปแบบการพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้คลอด

Abstract

This research investigated nursing supportive behaviors perceived by nurses and parturients at Rajavithi Hospital. The research subjects consisted of 55 nurses working at the labor & delivery unit and 150 primigravidas women who delivered and admitted to the postpartum ward of Rajavithi Hospital. The data collection instrument used was a questionnaire, modified from Bangon Siriburanapanont's questionnaire. Social support concept, Collister's concept, and nursing care principles, during labor were used as the conceptual framework for this study. The data were analyzed using arithmetic mean, standard deviation, and t-test at 95% confidence level.

The major finding showed those nurses' perceptions of providing nursing supportive behaviors to parturients was at a high level ($\bar{x} = 3.94$, S.D. = 0.38). The mode of emotional and informational support and physical comfort were at high levels. Whereas, the parturients' perceptions of receiving nursing supportive care behaviors from nurses was at a high level ($\bar{x} = 3.62$, S.D. = 0.24). The modes of emotional and informational support were at high levels; however, the physical comfort and safety support was perceived at moderate levels. Additionally, the study results indicated that nursing supportive behaviors perceived by nurses and parturients were statistically different at a significance level of .001. This study suggests that nurses should realize the significance of providing nursing support and evaluate the needs of the parturients before providing nursing care. Therefore, organizations should provide a continuous training program for nurses and promote nursing support that are appropriate to the parturients' needs.